## 乳がん化学療法レジメン

| レジメン名               | 薬品名      | 投与量                          | 投与時間       | 施行日(day)    | 1クール | 制吐リスク |
|---------------------|----------|------------------------------|------------|-------------|------|-------|
| w-PTX(3投1休)         | パクリタキセル  | 80mg/m²                      | 60分        | 1.8.15      | 28日  | 軽度    |
| w-PTX(12週連続)        | パクリタキセル  | 80mg/m <sup>²</sup>          | 60分        | 1.8.15…     | -    | 軽度    |
| Tmabアジュバンド(q3w)     | トラスツズマブ  | 6mg/kg(初回8mg/kg)             | 30分(初回90分) | 1           | 21日  | 最小度   |
| w-Tmab+w-PTX(3投1休)  | トラスツズマブ  | 2mg/kg(初回4mg/kg)             | 30分(初回90分) | 1.8.15.22   | 28日  | 軽度    |
|                     | パクリタキセル  | 80mg/m²                      | 60分        | 1.8.15      | 20口  |       |
| Per + Tmab          | パージェタ    | 420mg(初回840mg)               | 30分(初回90分) | 1           | 21日  | 最小度   |
|                     | トラスツズマブ  | 6mg/kg(初回8mg/kg)             | 30分(初回90分) |             |      |       |
| T-DM1               | カドサイラ    | 3.6mg/kg                     | 30分(初回90分) | 1           | 21日  | 軽度    |
| FEC100              | エピルビシン   | <b>100</b> mg/m <sup>2</sup> | 12分        | 1           | 21日  | 高度    |
|                     | フルオロウラシル | 500mg/m <sup>2</sup>         | 6分         |             |      |       |
|                     | エンドキサン   | 500mg/m <sup>2</sup>         | 60分        |             |      |       |
| FEC75               | エピルビシン   | 75mg/m²                      | 12分        | 1           | 21日  | 高度    |
|                     | フルオロウラシル | $500 \text{mg/m}^2$          | 6分         |             |      |       |
|                     | エンドキサン   | 500mg/m²                     | 60分        |             |      |       |
| тс                  | ドセタキセル   | 75mg/m <sup>2</sup>          | 60分        | 1           | 21日  | 高度    |
|                     | エンドキサン   | 600mg/m²                     | 60分        |             |      |       |
| DTX単独               | ドセタキセル   | 75mg/㎡(又は60mg/㎡)             | 60分        | 1           | 21日  | 軽度    |
| Tmab + DTX          | トラスツズマブ  | 2mg/kg(初回4mg/kg)             | 30分(初回90分) | 1.8.15<br>1 | 21日  | 軽度    |
|                     | ドセタキセル   | 60mg/m²                      | 60分        |             |      |       |
| nabPTX              | アブラキサン   | 260mg/m <sup>2</sup>         | 30分        | 1           | 21日  | 軽度    |
| Atezolizumab+nabPTX | テセントリク   | 840mg                        | 60分        | 1           | 28日  | 軽度    |
|                     | アブラキサン   | 100mg/m <sup>2</sup>         | 30分        | 1.8.15      |      |       |
| VNR単独               | ロゼウス     | 25mg/m <sup>2</sup>          | 5分         | 1.8         | 21日  | 最小度   |

| ロゼウス 25mg/m 5分 1.8  GEM単独 ゲムシタビン 1250mg/m 30分 1.8 21日 軽度  GEM単独+PTX パクリタキセル 175mg/m 60分 1  Bev+w-PTX 7パスチン 10mg/kg 30分(初回90分) 1.15 28日 軽度  Fribulin単独 ハラヴェン 1.4mg/m 5分 1.8 21日 軽度  パージェタ 420mg(初回840mg) 30分(初回90分) 1  トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1  ドセタキセル 75mg/m(又は60mg/kg) 60分 1  アバスチン 10mg/kg 30分(初回90分) 1  トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1  ドセタキセル 75mg/m(又は60mg/kg) 60分 1  アードリアシン 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1  トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1  エピルビシン 90mg/m 15分 1  エピルビシン 90mg/m 15分 1  エアドリアシン 600mg/m 30分 1  エアドリアシン 600mg/m 30分 15分  |                  |         |                          |            |            |     |     |
|---|------------------|---------|--------------------------|------------|------------|-----|-----|
| GEM単独+PTX         ゲムシタビン<br>パクリタキセル<br>パクリタキセル         1250mg/m³         30分         1.8         21日         軽度           Bev+w-PTX         アバスチン<br>パクリタキセル<br>パクリタキセル         10mg/kg<br>90mg/m³         30分(初回90分)<br>60分         1.15         28日         軽度           Eribulin単独         ハラヴェン         1.4mg/m³         5分         1.8         21日         軽度           Per+Tmab+DTX         トラスツズマブ<br>トラスツズマブ<br>トラスツズマブ<br>トラスツズマブ<br>インリタキセル         420mg(初回840mg)<br>6mg/kg(初回8mg/kg)         30分(初回90分)<br>60分         1         21日         軽度           アクリタキセル<br>カベシタビン         420mg(初回88mg/kg)<br>80mg/m³         30分(初回90分)<br>60分         1         21日         軽度           Tmab+Cape         トラスツズマブ<br>カベシタビン         6mg/kg(初回8mg/kg)<br>2500mg/m³         30分(初回90分)<br>60mg/m³         1         21日         最小度           EC         エピルビシン<br>エンドキサン<br>600mg/m³         15分<br>30分         1         21日         高度           AC         アドリアシン<br>60mg/m³         15分<br>1         1         21日         高度   | Tmab + VNR       |         |                          |            |            | 21日 | 最小度 |
| SEM単独+PTX   | GEM単独            | ゲムシタビン  | 1250mg/m <sup>2</sup>    | 30分        | 1.8        | 21日 | 軽度  |
| Per + Tmab + PTX  | GEM単独 + PTX      | ゲムシタビン  | 1250mg/m <sup>2</sup>    | 30分        | 1.8        | 21日 | 軽度  |
| Bev+w-PIX     パクリタキセル     90mg/m²     60分     1.8.15       Eribulin単独     ハラヴェン     1.4mg/m²     5分     1.8     21日     軽度       Per + Tmab + DTX     トラスツズマブ   |                  | パクリタキセル | 175mg/m <sup>2</sup>     | 60分        | 1          |     |     |
| Fribulin単独  | Bev+w-PTX        | アバスチン   | 10mg/kg                  | 30分(初回90分) | 1.15       | 28日 | 軽度  |
| Per+Tmab+DTX トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1 トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1 アセタキセル 75mg/㎡(又は60mg/kg) 60分 1  Per+Tmab+PTX トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1 アージェタ 420mg(初回840mg) 30分(初回90分) 1 トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1 アクリタキセル 80mg/㎡ 60分 1.8.15  Tmab+Cape トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1 カペシタビン 2500mg/㎡/日 1日2回 内服 1(夕)~15(朝) 21日 最小度  EC エピルビシン 90mg/㎡ 15分 1 21日 高度 アドリアシン 600mg/㎡ 30分   |                  | パクリタキセル | 90mg/m <sup>2</sup>      | 60分        | 1.8.15     |     |     |
| Per+Tmab+DTX     トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1     21日 軽度       ドセタキセル 75mg/㎡(又は60mg/kg) 60分 1     パージェタ 420mg(初回840mg) 30分(初回90分) 1       Per+Tmab+PTX     トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1     21日 軽度       パクリタキセル 80mg/㎡ 60分 1.8.15     トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1     21日 長小度       Tmab+Cape     トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1     21日 最小度       EC     エピルビシン 90mg/㎡ 15分 エンドキサン 600mg/㎡ 30分     15分 21日 高度       AC     アドリアシン 60mg/㎡ 15分 30分     1  | Eribulin単独       | ハラヴェン   | 1.4mg/m <sup>2</sup>     | 5分         | 1.8        | 21日 | 軽度  |
| ドセタキセル 75mg/㎡(又は60mg/kg) 60分 1  Per+Tmab+PTX トラスツズマプ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1  トラスツズマプ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1 21日 軽度 パクリタキセル 80mg/㎡ 60分 1.8.15  Tmab+Cape トラスツズマプ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1 カペシタビン 2500mg/㎡/日 1日2回 内服 1(夕)~15(朝) 21日 最小度  EC エピルビシン 90mg/㎡ 15分 1 21日 高度  AC アドリアシン 60mg/㎡ 30分 1 5分 1 5月 高度  | Per + Tmab + DTX | パージェタ   | 420mg(初回840mg)           | 30分(初回90分) | 1          |     |     |
| Per+Tmab+PTX トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1 トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1 21日 軽度 パクリタキセル 80mg/㎡ 60分 1.8.15  Tmab+Cape トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1 カペシタビン 2500mg/㎡/日 1日2回 内服 1(夕)~15(朝) 21日 最小度  EC エピルビシン 90mg/㎡ 15分 1 21日 高度 アドリアシン 60mg/㎡ 30分  |                  | トラスツズマブ | 6mg/kg(初回8mg/kg)         | 30分(初回90分) | 1          | 21日 | 軽度  |
| Per+Tmab+PTX     トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1 21日 軽度 パクリタキセル 80mg/m 60分 1.8.15       Tmab+Cape     トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1 カペシタビン 2500mg/m 月 1日2回 内服 1(夕)~15(朝) 21日 最小度       EC     エピルビシン 90mg/m 15分 エンドキサン 600mg/m 30分       AC     アドリアシン 60mg/m 15分 1   |                  | ドセタキセル  | 75mg/㎡(又は60mg/kg)        | 60分        | 1          |     |     |
| パクリタキセル   80mg/m²   60分   1.8.15 | Per + Tmab + PTX | パージェタ   | 420mg(初回840mg)           | 30分(初回90分) | 1          | 21日 | 軽度  |
| Tmab+Cape     トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) 30分(初回90分) 1       カペシタビン 2500mg/㎡/日 1日2回 内服 1(夕)~15(朝)       EC     エピルビシン 90mg/㎡ 15分 エンドキサン 600mg/㎡ 30分     1     21日 高度       AC     アドリアシン 60mg/㎡ 15分 1     1     21日 高度   |                  | トラスツズマブ | 6mg/kg(初回8mg/kg)         | 30分(初回90分) | 1          |     |     |
| Tmab+Cape カペシタビン 2500mg/m <sup>2</sup> /日 1日2回 内服 1(夕)~15(朝) 21日 最小度  エピルビシン 90mg/m <sup>2</sup> 15分 1 21日 高度  アドリアシン 60mg/m <sup>2</sup> 15分 1 21日 高度  |                  | パクリタキセル | 80mg/m <sup>2</sup>      | 60分        | 1.8.15     |     |     |
| カペシタビン     2500mg/m/日     1日2回 内服     1(タ)~15(朝)       EC     エピルビシン     90mg/m²     15分       エンドキサン     600mg/m²     30分       アドリアシン     60mg/m²     15分       AC     1     21日     高度   | Tmab + Cape      | トラスツズマブ | 6mg/kg(初回8mg/kg)         | 30分(初回90分) | 1          | 21日 | 最小度 |
| EC エンドキサン 600mg/m 30分 1 21日 高度 アドリアシン 60mg/m 15分 1 21日 高度   |                  | カペシタビン  | 2500mg/m <sup>2</sup> /日 | 1日2回 内服    | 1(夕)~15(朝) |     |     |
| エンドキサン 600mg/m 30分<br>アドリアシン 60mg/m 15分<br>AC 1 21日 高度  | EC               | エピルビシン  | 90mg/m²                  | 15分        | 1          | 21日 | 高度  |
| AC 1 21日 高度   |                  | エンドキサン  | 600mg/m <sup>2</sup>     | 30分        |            |     |     |
| バン エンドキサン 600mg/㎡ 30分 <sup>1</sup> 21日 間及   | AC               | アドリアシン  | 60mg/m²                  | 15分        | 1          | 21日 | 高度  |
|   |                  | エンドキサン  | 600mg/m <sup>2</sup>     | 30分        |            |     |     |