

膵臓・胆管がん化学療法レジメン

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	施行日(day)	1クール	制吐リスク
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	1.8.15	28日	軽度
GEM + nabPTX	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	1.8.15	28日	軽度
	アブラキサン	125mg/m ²	30分			
GEM + CDDP	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	1.8	21日	中程度～高度
	シスプラチン	25mg/m ²	60分	1.8		
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	1	14日	高度
	レボホリナート	200mg/m ²	120分			
	イリノテカン	180mg/m ²	90分			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	5分			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間			
NaI-IRI+5FU/LV	オニバイド	70mg/m ²	90分	1	14日	中等度
	レボホリナート	200mg/m ²	120分			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間			
GEM + S-1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	1.8	21日	軽度
	S-1	80mg/m ² /日	1日2回 内服	1(夕)～15(朝)		
Durval + GEM + CDDP (BW : 31kg以上)	イミフィンジ	1500mg	60分	1	21日	中程度～高度
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	1.8		
	シスプラチン	25mg/m ²	60分	1.8		
Durvalmab維持	イミフィンジ	1500mg	60分	1	28日	最小度